

**TRAŠŲ NORMOS IR NAUDOJIMAS
AZOTO TRAŠOS SU KALCIU**

Augalų grupė, augalų pavadinimas	Tręšimo periodas	Trašų norma, kg/ha
Rapsai:		
Žieminiai rapsai	Prieš sėją Pavasari vegetacijai atsinaujinus Butonizacijos pradžioje	120-150 400-450 130-170
Vasariniai rapsai	Prieš sėją Butonizacijos pradžioje	350-400 120-170
Šakniavaisiai ir šakniagumbiai:		
Pašariniai runkeliai	Prieš sėją 6-8 lapelių tarpsnyje	450-500 170-250
Cukriniai runkeliai	Prieš sėją 6-8 lapelių tarpsnyje	450 200
Bulvės	Prieš sodinimą Sudygus	350-370 170
Javai:		
Žieminiai kviečiai ir rugiai	Prieš sėją Pavasari atsinaujinus vegetacijai Bamblėjimo metu	120 250-400 170-250
Miežiai ir avižos	Prieš sėją Krūmijimosi – bamblėjimo metu	250-350 120-170
Varpinių– ankštinių javų mišinys grūdams	Prieš sėją Žaliajai masei	170-250 280-350
Linai:	Prieš sėją	120-170
Pievos ir ganyklos:	Pavasari Po pjūčių	250-280 170
Daržovės:		
Gūžiniai ir žiediniai kopūstai	Prieš sodinimą 4-6 lapelių tarpsnyje ir prieš gūžių ar žiedynų formavimą	400 170
Morkos, petražolės ir burokėliai	Prieš sėją 4-6 lapelių tarpsnyje	400 170
Vaiskrūmiai ir vaismedžiai:	Pirmaisiais ir antraisiais metais po pasodinimo, anksti pavasari Vėlesniais metais	200-250 300-350

Pastabos:

1. Vidutinės trašų normos tikslinamos atsižvelgiant į dirvožemyje bei augaluose esantį azoto kiekį, planuojamą užauginti derlių, augalų veisles, meteorologines ir kitas sąlygas.

