

## TRAŠŲ NORMOS IR NAUDOJIMAS KARBAMIDAS

Augalų grupė, augalų pavadinimas	Tręšimo periodas	Trašų norma, kg/ha
<b>Javai:</b>		
Žieminiai kviečiai	Prieš sėją Pavasariį atsinaujinus vegetacijai Bambėjimo pradžioje Plaukėjimo tarpsnyje (per lapus karbamido tirpalas)	Iki 60 130-190 65-100 40-50
Žieminiai rugiai	Prieš sėją Pavasariį atsinaujinus vegetacijai Bambėjimo pradžioje	Iki 40 150-190 55-100
Vasarojus	Prieš sėją Krūmijimosi – bambėjimo metu	110-170 65-110
Varpinių– ankštinių javų mišinys grūdams	Prieš sėją	65-90
Varpinių– ankštinių javų mišinys žaliajai masei	Prieš sėją	130-160
<b>Rapsai:</b>		
Žieminiai rapsai	Prieš sėją Pavasarių vegetacijai atsinaujinus Butonizacijos metu	Iki 60 180-250 60-100
Vasariniai rapsai	Prieš sėją Butonizacijos metu	160-230 60-100
<b>Šakniavaisiai ir šakniagumbiai:</b>		
Pašariniai runkeliai	Prieš sėją 6-10 lapelių tarpsnyje	210-280 150-200
Cukriniai runkeliai	Prieš sėją 6-10 lapelių tarpsnyje	190-260 70-120
Bulvės	Prieš sodinimą Nuo sudygimo iki bulvėms pasiekus 15-20 cm aukščio prieš apkaupiant	210-260 40-70
<b>Linai</b>	Prieš sėją	60-90
<b>Pievos ir ganyklos:</b>		
<b>Kukurūzai</b>	Pavasarių vegetacijai atsinaujinus Prieš sėją	Iki 190 210-260
<b>Daržovės</b>	Prieš sėją arba sodinimą Intensyvaus augimo metu	150-200 65-90
<b>Braškės</b>	Pavasarių vegetacijai atsinaujinus Nuskynus derlių	110-130 40-65
<b>Uogakrūmiai ir vaismedžiai</b>	Nuėmus derlių, lapų kritimo metu purkšti krūmus ir medžių lapus	50
<b>Žolynai ir vejos</b>	Pavasarių vegetacijai atsinaujinus	Iki 210

Pastabos:

1. Vidutinės trašų normos tikslinamos atsižvelgiant į dirvožemyje bei augaluose esantį azoto kiekį, planuojamą užauginti derlių, augalų veisles, meteorologines ir kitas sąlygas.