

TRAŠŲ NORMOS IR NAUDOJIMAS KARBAMIDO IR AMONIO SALIETROS TIRPALAS (KAS)

Augalai	Preparato norma, l / ha	Purškimo laikas
Žieminiai javai	50-80	Prieš sėją
	150-200	Pavasari vegetacijai atsinaujinus
	50-80	Bamblėjimo tarpsnyje
	20-40	Plaukėjimo tarpsnyje
	10-20	Pieninės brandos tarpsnyje
Žieminiai rapsai	50-80	Prieš sėją
	180-230	Pavasari vegetacijai atsinaujinus
	60-90	Butonizacijos tarpsnyje
	10-30	Prieš žydėjimą
Vasariniai rapsai	200-300	Prieš sėją
	50-80	4-5 lapų tarpsnyje
	10-40	Butonizacijos tarpsnyje
Vasariniai javai	150-250	Prieš sėją
	70-110	Krūmijimosi tarpsnyje
	40-70	Bamblėjimo tarpsnyje
Cukriniai runkeliai	150-300	Prieš sėją
	50-80	Intensyvaus lapų augimo tarpsnyje
Kukurūzai	150-250	Prieš sėją
Bulvės	150-250	Prieš sodinimą
Pievos ir ganyklos	150-250	Vegetacijai atsinaujinus
	70-150	Po kiekvieno nuganymo ar pjūties
Lauko daržovės	100-250	Prieš sėją
	30-70	Vegetacijos metu