

AZOTO TRĄŠOS SU KALCIU TRĄŠŲ NORMOS IR NAUDOJIMAS

Augalų grupė, augalų pavadinimas	Tręšimo periodas	Trąšų norma, kg/ha
1	2	3
Rapsai:		
Žieminiai rapsai	Prieš sėją	120-150
	Anksti pavasarį vegetacijai atsinaujinus	400-450
	Butonizacijos pradžioje	130-170
Vasariniai rapsai	Prieš sėją	350-400
	Butonizacijos pradžioje	120-170
Šakniavaisiai ir šakniagumbiai:		
Pašariniai runkeliai	Prieš sėją	450-500
	Esant 6-8 tikriesiems lapeliams	170-250
Cukriniai runkeliai	Prieš sėją	450
	Esant 6-8 tikriesiems lapeliams	200
Bulvės	Prieš sodinimą	350-370
	Sudygus	170
Javai:		
Žieminiai kviečiai ir rugiai	Prieš sėją	120
	Pavasariį atsinaujinus vegetacijai	250-400
	Bamblėjimo metu	170-250
Miežiai ir avižos	Prieš sėją	250-350
	Krūmijimosi-bamblėjimo metu	120-170
Varpinių-ankštinių javų mišinys grūdams	Prieš sėją	170-250
	Žaliajai masei	280-350
Linai:		
Pievos ir ganyklos:	Prieš sėją	120-170
	Pavasariį	250-280
	Po pjūčių	170
Daržovės:		
Gūžiniai ir žiediniai kopūstai	Prieš sodinimą	400
	4-6 lapelių tarpsnyje ir prieš gūžių ar žiedynų formavimąsi	170
Morkos, petražolės ir burokėliai	Prieš sėją	400
	4-6 lapelių tarpsnyje	170
Vaiskrūmiai ir vaismedžiai:	Pirmaisiais ir antraisiais metais po pasodinimo, anksti pavasarį	200-250
	Vėlesniais metais	300-350

Pastaba: Vidutinės trąšų normos tikslinamos atsižvelgiant į dirvožemyje bei augaluose esantį azoto kiekį, planuojamą užauginti derlių, augalų veisles, meteorologines ir kitas sąlygas.