

AZOTO TRĄŠOS SU SIERA TRĄŠŲ NORMOS IR NAUDOJIMAS

Augalai	Tręšimo laikas	Vidutinė norma, kg/ha
1	2	3
Rapsai:		
Žieminiai rapsai	Prieš sėją	100-130
	Pavasari vegetacijai atsinaujinus	350-400
	Butonizacijos metu	100-150
Vasariniai rapsai	Prieš sėją	300-350
	Butonizacijos metu	110-180
Šakniavaisiai ir šakniagumbiai:		
Bulvės	Prieš sodinimą	410-450
	Nuo sudygimo iki bulvėms pasiekus 15-20 cm aukščio	110-170
Cukriniai runkeliai	Prieš sodinimą	330-440
	6-10 lapelių tarpsnyje	110-170
Pašariniai runkeliai	Prieš sodinimą	370-480
	6-10 lapelių tarpsnyje	170-280
Javai:		
Žieminiai kviečiai	Prieš sėją	Iki 100
	Pavasari vegetacijai atsinaujinus	220-330
	Bamblių tarpsnyje	110-170
	Plaukėjimo tarpsnyje	80-110
Žieminiai rugiai	Prieš sėją	Iki 70
	Pavasari vegetacijai atsinaujinus	260-300
	Bamblių tarpsnyje	110-220
Vasarojus	Prieš sėją	190-330
	Krūmijimosi – bamblių tarpsniuose	110-190
Varpinių – ankštinių javų mišinys grūdams	Prieš sėją	110-150
Varpinių – ankštinių javų mišinys žaliajai masei	Prieš sėją	220-260
Linai (*- aliejiniai; **- sėmeniniai)	Prieš sėją Eglutės tarpsniu	110-170*/100** 110-170*/50**
Pievos ir ganyklos	Pavasari vegetacijai atsinaujinus	Iki 330
Kukurūzai	Prieš sėją	370-450
Daržovės:		
Gūžiniai ir žiediniai kopūstai	Prieš sėją arba sodinimą	260-350
	4-6 lapelių tarpsnyje ir prieš gūžių ar žiedynų formavimą	110-150
Morkos, burokėliai	Prieš sėją	260-350
	4-6 lapelių tarpsnyje	110-150
Sodo augalai:		
Uogynai	Pirmaisiais ir antraisiais metais po pasodinimo, anksti pavasarį	110-150
	Vėlesniais metais	220-260
Kaulavaisiai	Pirmaisiais ir antraisiais metais po pasodinimo, anksti pavasarį	150-190
	Vėlesniais metais	280-310
Sėklavaisiai	Pirmaisiais ir antraisiais metais po pasodinimo, anksti pavasarį	180-220
	Vėlesniais metais	310-350
Žolynai ir vejės	Pavasari vegetacijai atsinaujinus	Iki 350

Pastaba: Vidutinės trąšų normos tikslinamos atsižvelgiant į dirvožemyje bei augaluose esantį azoto kiekį, planuojamą užauginti derlių, augalų veisles, meteorologines ir kitas sąlygas.