

KARBAMIDAS TRAŠŲ NORMOS IR NAUDOJIMAS

Augalai	Tręšimo laikas	Vidutinė norma, kg/ha
Javai:		
Žieminiai kviečiai	Prieš sėją Pavasari atsinaujinus vegetacijai Bambėjimo pradžioje Plaukėjimo tarpsnyje (per lapus karbamido tirpalas)	Iki 60 130-190 65-100 40-50
Žieminiai rugiai	Prieš sėją Pavasari vegetacijai atsinaujinus Bambėjimo pradžioje	Iki 40 150-190 55-100
Vasarojus	Prieš sėją Krūmijimosi – bambėjimo metu	110-170 65-110
Varpinių – ankštinių javų mišinys grūdams	Prieš sėją	65-90
Varpinių – ankštinių javų mišinys žaliajai masei	Prieš sėją	130-160
Rapsai:		
Žieminiai rapsai	Prieš sėją Pavasari vegetacijai atsinaujinus Butonizacijos metu	Iki 60 180-250 60-100
Vasariniai rapsai	Prieš sėją Butonizacijos metu	160-230 60-100
Šakniavaisiai ir šakniagumbiai:		
Bulvės	Prieš sodinimą Nuo sudygimo iki bulvėms pasiekus 15-20 cm aukščio prieš apkaupiant	210-260 40-70
Cukriniai runkeliai	Prieš sėją 6-10 lapelių tarpsnyje	190-260 70-120
Pašariniai runkeliai	Prieš sėją 6-10 lapelių tarpsnyje	210-280 150-200
Linai	Prieš sėją	60-90
Pievos ir ganyklos	Pavasari vegetacijai atsinaujinus	Iki 190
Kukurūzai	Prieš sėją	210-260
Daržovės	Prieš sėją arba sodinimą Intensyvaus augimo metu	150-200 65-90
Braškės	Pavasari vegetacijai atsinaujinus Nuskynus derlių	110-130 40-65
Uogakrūmiai ir vaismedžiai	Nuėmus derlių, lapų kritimo metu purkšti krūmus ir medžių lapus	50
Žolynai ir vejės	Pavasari vegetacijai atsinaujinus	Iki 210



KONCERNO „ACHEMOS GRUPĖ“ NARĖ

Pastaba: Vidutinės trąšų normos tikslinamos atsižvelgiant į dirvožemyje bei augaluose esantį azoto kiekį, planuojamą užauginti derlių, augalų veisles, meteorologines ir kitas sąlygas.