

LIETUVIŠKA AMONIO SALIETRA TRAŠŲ NORMOS IR NAUDOJIMAS

Augalai	Tręšimo laikas	Vidutinė norma, kg/ha
Javai:		
Žieminiai kviečiai	Prieš sėją	Iki 100
	Pavasari vegetacijai atsinaujinus	180-200
	Bamblėjimo tarpsnyje	90-110
	Plaukėjimo tarpsnyje	60-90
Žieminiai rugiai	Prieš sėją	Iki 60
	Pavasari vegetacijai atsinaujinus	200-260
	Bamblėjimo tarpsnyje	90-180
Vasarojus	Prieš sėją	150-230
	Krūmijimosi – bamblėjimo tarpsniuose	90-120
Varpinių – ankštinių javų mišinys grūdams	Prieš sėją	90-120
Varpinių– ankštinių javų mišinys žaliajai masei	Prieš sėją	180-220
Rapsai:		
Žieminiai rapsai	Prieš sėją	70-100
	Pavasari vegetacijai atsinaujinus	280-320
	Butonizacijos metu	90-100
Vasariniai rapsai	Prieš sėją	230-280
	Butonizacijos metu	90-120
Šakniagumbiai ir šakniavaisiai:		
Bulvės	Prieš sodinimą	300-350
	Nuo sudygimo iki bulvėms pasiekus 15-20 cm aukščio	60-90
Cukriniai runkeliai	Prieš sėją 6-10 lapelių tarpsnyje	260-350 90-120
Pašariniai runkeliai	Prieš sėją 6-10 lapelių tarpsnyje	300-380 180-220
Linai (*-aliejiniai) (**-pluoštiniai)	Prieš sėją	110-170*/100**
	Eglutės tarpsniu	110-170*/50**
Pievos ir ganyklos	Pavasari vegetacijai atsinaujinus	Iki 260
	Po nuganyimo ar nušienavimo	180-210
Kukurūzai	Prieš sėją	300-350
Daržovės	Prieš sėją	90-250
Sodo augalai:		
Uogynai	Pirmaisiais ir antraisiais metais po pasodinimo, anksti pavasarį	90-120
	Vėlesniais metais	180-210
Kaulavaisiai	Pirmaisiais ir antraisiais metais po	120-150



KONCERNO „ACHEMOS GRUPĖ“ NARĖ

	pasodinimo, anksti pavasarį Vėlesniais metais	220-250
Sėklavaisiai	Pirmaisiais ir antraisiais metais po pasodinimo, anksti pavasarį	150-180
	Vėlesniais metais	250-280
Žolynai ir vejės	Pavasarių vegetacijai atsinaujinus	Iki 300
	Po nušienavimo	50-150

Pastaba: Vidutinės trąšų normos paruoštos pagal Direktyvos (EB) Nr. 91/676/EEB reikalavimus. Jos tikslinamos atsižvelgiant į dirvožemyje bei augaluose esantį azoto kiekį, planuojamą užauginti derlių, augalų veisles, meteorologines ir kitas sąlygas.